

腸見淨[®]粉劑 GI Klean[®] Powder 使用說明

無痛大腸鏡檢查

早上檢查者：

1. 檢查前一日__月__日晚上6點將腸見淨一包加1000cc的水攪拌至完全溶解，每15分鐘喝250cc腸見淨溶液，60~90分鐘後會開始腹瀉，作用時間約3小時，請勿再進食任何食物，仍可繼續補充水份。
2. 檢查當日__月__日早上5點半以同樣方式泡製再喝一包腸見淨溶液。
3. 二包瀉劑務必服用完畢以免影響檢查結果。

下午檢查者：

1. 檢查前一日__月__日晚上6點將腸見淨一包加1000cc的水攪拌至完全溶解，每15分鐘喝250cc腸見淨溶液，60~90分鐘後會開始腹瀉，作用時間約3小時，請勿再進食任何食物，仍可繼續補充水份。
2. 檢查當日__月__日早上10點以同樣方式泡製再喝一包腸見淨溶液。
3. 二包瀉劑務必服用完畢以免影響檢查結果。

乙狀結腸鏡檢查

1. 檢查前一日__月__日晚上6點將腸見淨一包加1000cc的水攪拌至完全溶解，每15分鐘喝250cc腸見淨溶液，60~90分鐘後會開始腹瀉，作用時間約3小時，請勿再進食任何食物，仍可繼續補充水份。

腸見淨粉劑 GI Klean Powder 使用方法

1. 每包腸見淨粉末加冷開水泡製成1000毫升溶液，攪拌至粉末完全溶解為止。
2. 每15分鐘喝250毫升。



糖尿病患者用藥需知

糖尿病患之降血糖藥物，檢查前一日及檢查當日暫勿服用，藥物請記得隨身攜帶。低渣飲食期間，若有不適請測量血糖；若因飲食習慣而發生低血糖症狀，請儘快採取低血糖處置，如口含糖果，飲用無渣含糖飲料。